

Cimici, ospiti sgraditi sempre più diffusi in giardini e abitazioni.

Giardini, orti domestici e abitazioni sono sempre più invasi da cimici di varia forma, colore e dimensione. I danni alle colture e i fastidi alle persone aumentano di anno in anno, ma l'utilizzo di insetticidi nelle abitazioni o negli orti domestici è di scarsa utilità nel contenimento delle infestazioni

Come si riconoscono

La cimice asiatica

È la specie più diffusa e invadente. *Halyomorpha halys* da alcuni anni si è ormai stabilmente insediata nei nostri territori. Gli esemplari adulti, di colore grigio brunastro, formano in autunno-inverno fastidiose aggregazioni all'interno delle case, in attesa che il clima primaverile consenta loro di iniziare le attività all'aperto.

La cimice verde

Nezara viridula è conosciuta anche come "cimice del pomodoro" per i danni che causa a questa coltura. Anche gli esemplari adulti di questa specie, in autunno, entrano spesso nelle abitazioni in cerca di un riparo per l'inverno.



Forma adulta di Cimice verde

Cimice asiatica adulta



La cimice dell'olmo

Arocatus melanocephalus presenta una distribuzione più localizzata. Negli areali più infestati, invade in gran numero le abitazioni nella prima parte dell'estate (a partire dal mese di giugno) e in misura minore all'inizio dell'autunno, con grave disagio da parte della popolazione.



Cimice dell'olmo adulta

I problemi e i fastidi che creano

Tutte queste cimici sono innocue per l'uomo ma emettono un odore particolarmente sgradevole quando vengono molestate. La cimice verde e la cimice asiatica possono inoltre recare danno ad ortaggi e frutti in via di maturazione.

Cosa fare

Per ridurre l'ingresso di cimici nelle case occorre:

- Utilizzare le zanzariere anche durante le ore diurne
- Sigillare tutti gli accessi che potrebbero consentirne il passaggio
- Controllare il bucato steso all'esterno prima di introdurlo in casa (le cimici tendono ad infilarsi tra gli indumenti)

Per ridurre i danni alle colture nell'orto domestico è utile coprire gli ortaggi con reti anti-insetto già dalla fine dell'estate. Questa operazione previene il danno diretto delle cimici sugli ortaggi e ostacola le ovideposizioni.

Cosa non fare

L'utilizzo di insetticidi nelle abitazioni o negli orti domestici è di scarsa utilità nel contenimento delle infestazioni, non previene le nuove invasioni dagli ambienti vicini ed è letale per le api e gli altri insetti utili (come bombi e farfalle) che frequentano il nostro giardino.

Forme giovanili di cimice asiatica



Per ulteriori informazioni è possibile contattare i tecnici del C.A.A. "Giorgio Nicoli" S.r.l. (051/6802227) rferrari@caa.it